

DIPINOX COMPUESTO®



Comprimidos recubiertos
Inyectable



NUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DIPINOX COMPUESTO es la asociación de un antiespasmódico, el propinox clorhidrato y un analgésico antiinflamatorio, el clonixinato de lisina, indicado para casos de dolor espasmódico de diferente etiología.

COMPOSICIÓN

DIPINOX COMPUESTO, comprimidos recubiertos, cada comprimido contiene propinox clorhidrato 10 mg y clonixinato de lisina 125 mg.

DIPINOX COMPUESTO, solución inyectable, cada ampolla contiene, ampolla I: propinox clorhidrato 15 mg; ampolla II: clonixinato de lisina 100 mg.

FARMACODINÁMICA

Propinox corresponde al grupo de los antiespasmódicos. Antagoniza los receptores muscarínicos de la musculatura lisa de los órganos huecos inhibiendo su contracción. Cumple además una función directa inhibitoria sobre la actividad de dicha musculatura.

Clonixinato de lisina es un analgésico - antiinflamatorio no esterooidal cuya acción farmacológica más efectiva es la analgésica. Inhibe en forma parcialmente selectiva a la enzima ciclooxigenasa - 2, responsable de la producción de prostaglandinas involucradas en procesos de dolor. Al mismo tiempo, no afecta en mayor medida a ciclooxigenasa - 1, responsable de la producción de prostaglandinas involucradas en diversas funciones fisiológicas del organismo.

INDICACIONES Y USO

DIPINOX COMPUESTO está indicado en casos de dolor espasmódico originado en el tubo digestivo, vía biliar, aparato genital femenino, y vías urinarias, por ejemplo: gastroenteritis, intoxicación alimentaria, colecistitis, colelitiasis, dismenorrea primaria, litiasis ureteral, infección de vías urinarias, cistitis, etc.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS RECOMENDADAS

Dipinox comprimidos: adultos y niños mayores de 12 años: 1 - 2 comprimidos 3 - 4 veces por día, sin sobrepasar la dosis máxima diaria de 6 comprimidos. No masticar ni triturar los comprimidos. Administrar con abundante agua.

Dipinox inyectable: adultos: 1 - 4 dosis diarias administradas por vía IV o IM.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

DIPINOX COMPUESTO comprimidos se debe

administrar por vía oral.

DIPINOX COMPUESTO Inyectable debe administrarse mediante inyección intramuscular profunda o intravenosa lenta.

PREPARACIÓN DE LA DOSIS INYECTABLE

Utilizar una jeringuilla estéril con una aguja hipodérmica para inyección intramuscular o intravenosa. Aspirar el contenido de la ampolla I y la ampolla II en la misma jeringa, sin importar el orden con el cual se realice el procedimiento. Retirar el aire de la jeringa y administrar por vía IM o IV. La administración intravenosa debe realizarse lentamente (en 1 - 2 minutos). Es preferible administrar el producto directamente en la vena o utilizar la llave de tres vías o el dispositivo de medicación complementaria del catéter. El producto debe administrarse sin diluir ni emplear las tubuladuras del equipo de venoclisis.

FARMACOCINÉTICA

El propinox clorhidrato luego de su administración, alcanza una concentración plasmática máxima dentro de la primera hora. El metabolismo y la eliminación se cumplen en el hígado. La vida media de eliminación es de 4 horas. La unión a las proteínas plasmáticas es de un 90 %. Se considera que puede atravesar la membrana hematoencefálica y la membrana placentaria; es posible su eliminación por la leche materna.

El clonixinato de lisina alcanza la concentración plasmática máxima dentro de la primera hora después de su administración. La biodisponibilidad es del 56 %. La vida media es de aproximadamente 1.75 horas. Se une a las proteínas plasmáticas en un 97 %. Se elimina por vía urinaria en forma de metabolitos. Está presente en baja concentración en la leche materna.

CONTRAINDICACIONES

Embarazo y lactancia materna.

Hipersensibilidad a los componentes del producto, enfermedad ácido - péptica activa, hemorragia digestiva, estenosis pilórica, hipertrofia prostática, glaucoma; antecedentes de broncoespasmo, pólipos nasales, angioedema o urticaria producidos por AINES, atonía intestinal, ileo paralítico, colitis ulcerosa, miastenia gravis, niños menores de 12 años de edad.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Por su contenido de clonixinato de lisina, DIPINOX COMPUESTO debe administrarse con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad ácido - péptica o hemorragia digestiva. Como todo

medicamento antiespasmódico - analgésico DIPINOX COMPUESTO debe utilizarse solamente cuando se haya descartado una enfermedad abdominal aguda de resolución quirúrgica.

Embarazo: contraindicado. **Lactancia:** contraindicado. **Pediatría:** la forma inyectable se puede utilizar a partir de los 12 años de edad. **Ancianos:** tienen mayor riesgo de eventos adversos. Usar con precaución. **Capacidad para conducir vehículos u operar maquinaria:** debido a que puede provocar somnolencia, se recomienda tener precaución al conducir vehículos o utilizar maquinaria pesada.

INTERACCIONES

Administrar con precaución a pacientes que están recibiendo medicamentos anticolinérgicos o medicamentos con efectos anticolinérgicos, como antidepressivos tricíclicos, antihistamínicos, quinidina, porque los efectos indeseables pueden potencializarse.

Debido al clonixinato de lisina, no se debe administrar conjuntamente con otros AINEs, porque aumenta el riesgo de úlcera gastroduodenal y sangrado digestivo.

La administración conjunta con metotrexate puede incrementar la toxicidad hematológica del metotrexate.

EFFECTOS ADVERSOS

La combinación de propinox clorhidrato y clonixinato de lisina es bien tolerada. Pueden presentarse molestias leves y pasajeras como sequedad de la boca, náusea, vómito, estreñimiento, irritación gástrica y somnolencia. Son posibles efectos cutáneos de hipersensibilidad e irritación, ulceración o sangrado gastrointestinal. Dosis elevadas pueden inhibir la sudoración y dificultar el control de la temperatura corporal especialmente en pacientes con fiebre.

VIDA ÚTIL: 24 meses

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura menor a 30 °C, protegido de la humedad.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños

PRESENTACIONES COMERCIALES

DIPINOX COMPUESTO comprimidos, caja por 20. DIPINOX COMPUESTO inyectable, caja con una dosis (una ampolla I y una ampolla II) más jeringa descartable

DIPINOX GOTAS®



Gotas 10 mg/ml de propinox



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DIPINOX gotas contiene un antiespasmódico, el propinox clorhidrato, indicado para casos de dolor espasmódico de diferente etiología.

COMPOSICIÓN

DIPINOX GOTAS, cada 1 ml contiene propinox clorhidrato 10mg. Cada 1 ml contiene 20 gotas (1 gota = 0.5 mg)

FARMACODINÁMICA

DIPINOX GOTAS es propinox clorhidrato, un medicamento con propiedades antiespasmódicas. Antagoniza los receptores muscarínicos de la musculatura lisa de los órganos huecos inhibiendo su contracción. Cumple además una función directa inhibitoria sobre la actividad de dicha musculatura.

INDICACIONES Y USO

DIPINOX GOTAS para el tratamiento del dolor espasmódico originado en el tubo digestivo, vía biliar, vías urinarias y aparato genital femenino, por cuadros patológicos como gastroenteritis, intoxicación alimentaria, colecistitis, colelitiasis, litiasis ureteral, infección de vías urinarias, cistitis, dismenorrea primaria, etc.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS RECOMENDADAS

DIPINOX gotas se dosifica, salvo indicación médica especial:

Adultos y niños mayores de 12 años: 20 gotas, hasta 3 veces por día.

Niños de 2 a 12 años: 1 – 2 gotas por cada año de edad, hasta 3 veces al día.

Lactantes: 1 gota hasta 3 veces al día.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

DIPINOX GOTAS se debe administrar por vía oral.

FARMACOCINÉTICA

Luego de su administración, la concentración plasmática máxima se alcanza dentro de la primera hora. El metabolismo y la eliminación se cumplen en el hígado. La vida media de eliminación es de 4 horas. La unión a las proteínas plasmáticas es de un 90%. Se considera que puede atravesar la membrana hematoencefálica y la membrana placentaria; es posible su eliminación por la leche materna.

CONTRAINDICACIONES

DIPINOX GOTAS está contraindicado en hipersensibilidad a los componentes del producto o en cualquier circunstancia en la cual no exista certeza diagnóstica o no se pueda descartar un proceso de resolución quirúrgica en curso y que amerite observación sin el uso de analgésicos o antiespasmódicos. El producto se contraindica en el embarazo y lactancia materna.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Los eventos adversos son más frecuentes mientras más joven es el paciente. DIPINOX GOTAS es un producto que debe ser utilizado bajo una monitorización médica.

Embarazo: contraindicado. **Lactancia:** contraindicado. **Pediatría:** usar bajo monitoreo médico. **Ancianos:** tienen mayor riesgo de eventos adversos. Usar con precaución. **Capacidad para conducir vehículos u operar maquinaria:** debido a que puede provocar somnolencia, se recomienda tener precaución al conducir vehículos o utilizar maquinaria pesada.

INTERACCIONES

No se han descrito

EFFECTOS ADVERSOS

Pueden presentarse manifestaciones anticolinérgicas leves y pasajeras como sequedad de la boca, náusea, vómito, estreñimiento, irritación gástrica y somnolencia. Son posibles efectos cutáneos de hipersensibilidad. Los pacientes pediátricos pueden presentar íleo paralítico, atonía gástrica. Muy raramente se ha descrito con los antiespasmódicos confusión, desorientación, alucinaciones, irritabilidad, ataxia, coma, depresión respiratoria y depresión circulatoria.

VIDA ÚTIL: 24 meses

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura menor a 30 °C, protegido de la humedad.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños

PRESENTACIÓN COMERCIAL

DIPINOX GOTAS, frasco por 20 ml.