

IVERLIF L.A. OMEGA 3®

FICHA TÉCNICA



**Endectocida inyectable
de larga acción**



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN

Ivermectina	1%
Aceite de Hígado de Bacalao c.s.p.	100 ml

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos y ovinos.

INDICACIONES

iverlif L.A. Omega 3 es un antiparasitario interno y externo de amplio espectro, activo contra parásitos gastrointestinales y pulmonares y ectoparásitos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

la dosis recomendada de **iverlif L.A. Omega 3** es de 1 ml cada 50 kg de peso animal, lo que equivale a 200 µg de Ivermectina por kg de peso del animal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía intramuscular o subcutánea, (por esta última vía administrar, en la parte anterior o posterior de la paleta).

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.
Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de reacción anafiláctica administrar adrenalina.

Puede ocurrir con el tiempo que el producto se enturbie, no es indicación de pérdida de actividad, en esos casos se recomienda AGITAR ANTES DE USAR. No descartar el material en medios acuáticos debido a que la ivermectina es extremadamente tóxica para las especies vivas de dicho ecosistema. Elimine los recipientes vacíos enterrándolos o incinerándolos, para evitar contaminación del medio ambiente.

TIEMPO DE RETIRO

No se debe sacrificar animales cuya carne se destine a consumo humano hasta transcurridos 30 días del último tratamiento.

No se debe tratar animales en lactación cuando la leche se destine al consumo humano.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en equinos.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C y proteger de la luz.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

36 meses.

PRESENTACIÓN

Frascos x 100 y 500 ml.

REGISTRO:

Ecuador 3A1-B1-8471-AGROCALIDAD

**ELABORADO POR VIRBAC URUGUAY
S.A., MONTEVIDEO-URUGUAY Y
DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS
LIFE - ECUADOR**