

# RADEK F®



**Fasciolicida y nematicida  
interno oral**



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

## COMPOSICIÓN

Cada ml contiene:

Fenbendazol 100 mg

Triclabendazol 100 mg

Excipientes c.s.

## FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión.

## ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, ovinos y caprinos.

## INDICACIONES

Control de parásitos de bovinos, ovinos y caprinos: *Fasciola hepatica*, *Ostertagia ostertagi*, (L3 y L4 incluyendo inhibidas), *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Strongyloides spp.*, *Capillaria spp.*, *Bunostomum spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Chavertia spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Moniezia spp.*,

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

**radek F** se administra en una sola dosis de 6 ml / 50 kg.

## VIA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

# FICHA TÉCNICA

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR  
LABORATORIOS LIFE-ECUADOR

## PRECAUCIONES

Uso Veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## TIEMPO DE RETIRO

No administrar a vacas en lactancia cuando se destine la leche a la alimentación humana. No sacrificar animales cuya carne se destine al consumo humano, hasta transcurridos 28 días del último tratamiento.

## TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

## ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C y proteger de la luz.

## PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

24 meses.

## PRESENTACIÓN

Envases plásticos x 1 litro.

## REGISTRO:

Ecuador 2C4-8827-AGROCALIDAD