



Tubo 20 g de Sertaconazol



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN

ZALAIN crema contiene 20 mg / g de sertaconazol nitrato.

FARMACOLOGÍA

ZALAIN® es un nuevo antimicótico tópico con potente actividad fungicida y con amplio espectro, en el que se incluyen dermatofitos (Trychophyton, Epidermophyton y Microsporum), hongos filamentosos oportunistas (Scopulariopsis), levaduras (Cándida albicans, C. tropicalis, etcétera) y Ptyrosporum (ovale y orbiculare), así como otros agentes causantes y acompañantes de infecciones de la piel y mucosas, tales como gérmenes gram positivos (Staphylococcus y Streptococcus).

MECANISMO DE ACCION

Su estructura química que contiene un grupo benzotiofeno-azólico, por su similitud con el triptófano, le permite gran afinidad por la membrana celular del hongo.

- Efecto Fungistático: interfiere con la síntesis de ergosterol. Los hongos requieren ergosterol para incorporarlo en la síntesis de su pared.
- Efecto Fungicida: lesión directa de la membrana celular del hongo. La microscopía electrónica puede detectar la formación de verdaderos cráteres en la membrana a través de los cuales salen rápidamente al exterior de la célula cantidades importantes de ATP (adenosintrifosfato = molécula fundamental para el almacenamiento de energía por parte de la célula) y de potasio, elementos sin los cuales la célula no puede vivir.
- Impide cambio dimórfico: la transformación a hifas y pseudohifas vuelve activo al hongo.
- Actividad antibacteriana, antiparasitaria y antiinflamatoria.

INDICACIONES

Tratamiento tópico de las micosis superficiales, como las dermatofitosis, Tinea pedis, Tinea cruris, Tinea corporis, Tinea barbae y Tinea manus, candidiasis y Ptyriasis versicolor.

Tratamiento tópico de las infecciones ungueales producidas por cándida y dermatofitos con exudado, especialmente intertrigo.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al sertaconazol.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

ZALAIN® no debe usarse para tratamientos oftálmicos.

Debido al contenido alcohólico de ZALAIN® solución, puede producirse ocasionalmente, durante los primeros días, una sensación de escozor ligero y pasajero, y sequedad cutánea, que no suelen determinar la supresión del tratamiento.

Embarazo: Después de la aplicación tópica de grandes cantidades, no se detectan niveles plasmáticos; a pesar de ello, no se ha demostrado su inocuidad en mujeres embarazadas; por tanto, debe evaluarse la relación riesgo-beneficio antes de su utilización durante el embarazo y lactancia.

EFFECTOS ADVERSOS

Su seguridad en tratamientos locales es excelente; no se ha observado efectos tóxicos o fotosensibles. Ha habido informes aislados de reacción eritematosa local ligera y pasajera durante los primeros días de tratamiento; no ha sido necesaria la suspensión del tratamiento.

POSOLOGÍA:

ZALAIN® se administra por vía tópica. Aplicar una o dos veces al día (preferentemente por la noche o mañana y noche), de forma suave y uniforme sobre la lesión, procurando además abarcar una superficie de piel sana alrededor de la zona afectada. La duración del tratamiento recomendado es de cuatro semanas para asegurar una completa curación clínica y microbiológica; en muchos casos, la curación clínico-microbiológica aparece antes, entre las dos y cuatro semanas de tratamiento.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

ZALAIN® crema al 2%. Envase conteniendo 20 g de crema.