

ANTIBANG®

FICHA TÉCNICA



Vacuna viva contra la brucelosis



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN

Cada dosis (2 ml) contiene de 15.000 a 30.000 millones de gérmenes vivos de *Brucella abortus* (Cepa 19).

FORMA FARMACÉUTICA

Vacuna viva liofilizada

INDICACIONES

Inmunización contra la brucelosis. Se aconseja el uso en todas las ganaderías, puesto que es una enfermedad infecto-contagiosa de alta difusión y transmisible a la especie humana.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Hembras de la especie bovina.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Vacunar todas las terneras de 3 a 8 meses de edad, por una sola vez. La dosis general es de 2 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

PRECAUCIONES:

Uso veterinario.
Mantener fuera del alcance de los

niños.

La vacuna debe ser reconstituida y usada inmediatamente.

La exposición de la vacuna a la luz solar y la demora en su aplicación deterioran el producto.

Los envases y restos de vacuna no empleada deben ser desechados y preferiblemente quemados.

En caso de reacción anafiláctica, administrar adrenalina (epinefrina) y un corticoide tipo dexametasona y consultar al médico veterinario. En caso de animales con antecedentes de reacción anafiláctica, puede evitarse o disminuirse el grado de la misma, mediante la aplicación de un antihistamínico 30 a 45 minutos antes de la vacunación.

La cepa 19 es patógena para el ser humano. Evítese la inoculación accidental de la vacuna o su contacto con heridas o mucosas (ojos, labios, etc.). En caso de que esto ocurra, es aconsejable consultar al Médico.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 21 días.

CONTRAINDICACIONES:

No vacunar los machos (toros).

No vacunar animales adultos.

No administrar en equinos.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar en refrigeración entre 3 - 7°C.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

13 meses

PRESENTACIÓN

Frasco de 5 dosis, acompañado de diluyente.

REGISTRO:

ECUADOR 4A-1957- AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE - ECUADOR