

# BONGO FLEALESS SPRAY®



## Pulguicida - Garrapaticida



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

### COMPOSICIÓN

Cada 100 ml de solución contienen:  
Fipronil: ..... 0,25 g  
Vehículo y excipientes c.s.

### FORMA FARMACÉUTICA

Solución spray.

### ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Caninos y felinos.

### INDICACIONES

Control de parásitos externos en perros y gatos. Se recomienda especialmente contra:  
Pulgas: *Ctenocephalides canis* (pulga del perro), *Ctenocephalides felis* (pulga del gato).

Garrapatas: *Rhipicephalus sanguineus*. (garrapata marrón del perro), *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*.

Piojos: *Trichodectes canis*.

Ácaros: *Trombicula autumnalis* (trombiculosis), *Otodectes cynotis* (Sarna de las orejas).

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

No bañar al animal 48 horas antes o después de la aplicación del producto. Rociar toda la superficie del animal hasta humedecerlo completamente, manteniendo el envase a una distancia aproximada de 20 cm. Cuidar que el producto no llegue directamente a ojos, nariz, boca y oídos. La dosis recomendada de **Bongo Flealess**

# FICHA TÉCNICA

**Spray** es de 3 a 6 ml de la solución por kilo de peso del animal, equivalente a 5 a 10 pulsaciones por kilo de peso del animal. (Una pulsación equivale a 0,6 ml de solución en promedio). Utilizando guantes frotar a contrapelo para que el producto entre en contacto con la piel. Dejar secar el animal evitando que se lama. Cachorros y gatitos que estén todavía con su madre y a los que se aplique el producto, deben mantenerse alejados de ella hasta que estén completamente secos para prevenir que pueda ingerir el producto al lamerlos. Puede usarse en hembras preñadas y en lactancia. También en cachorros a partir de las 4 semanas de edad y en gatitos a partir de las 8 semanas de edad.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Uso externo. Administrar sobre la piel.

### PRECAUCIONES:

Uso veterinario.  
Mantener alejado de los niños y los alimentos.  
Evitar todo contacto con la piel y ojos, es conveniente utilizar guantes y gafas para su aplicación. Lavarse bien con agua y jabón después de aplicar el producto.  
Evite aspirar el producto.

### TOXICIDAD

En caso de ingestión accidental o intoxicación llamar inmediatamente al médico.

El producto no tiene antídoto. En caso de intoxicación realizar tratamiento sintomático y de sostén.

En caso de inhalación remover la persona a un lugar con aire fresco con abundante agua y jabón. Consultar al médico si la irritación persiste.

En caso de tener contacto con la piel, lavar inmediatamente

### CONTRAINDICACIONES:

No administrar a animales enfermos, debilitados y/o con deficiencias nutricionales severas. No utilizar en conejos.

### TIPO DE VENTA

Producto de venta libre.

### ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original herméticamente cerrado a una temperatura no mayor a 30°C, al abrigo de la luz y alejado de los alimentos.

### PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

24 meses.

### PRESENTACIÓN

Envase x 120 ml con válvula spray.

### REGISTRO:

Ecuador 3B-14144-AGROCALIDAD

### ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR