

# BONGO FLEALESS PLUS®



**Pulguicida, garrapaticida y repelente**



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

## COMPOSICIÓN

Imidacloprid	10 g
Permetrina	45 g
Fenoxicarb	0,6 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

## FORMA FARMACÉUTICA

Solución Spot on.

## ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Caninos.

## INDICACIONES

Para el control de pulgas, garrapatas y piojos y como repelente contra moscas y mosquitos en perros. Como pulguicida elimina la pulga adulta y altera la ovogénesis, la embriogénesis, la metamorfosis, la fecundidad y la fertilidad de los parásitos expuestos, controlando la reinfestación, por lo que puede ser utilizado en el tratamiento integral de las dermatitis alérgicas causadas por las pulgas, junto con el tratamiento sintomático que indique el Médico Veterinario.

## INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

Romper la base de la aleta de la pipeta por la parte más fina.

Separar el pelo y aplicar el producto directamente sobre la piel del animal a nivel de la base del cuello o entre los hombros, para evitar lamidos.

En caso de animales con abundante pelaje, se debe despejar el mismo hasta visualizar la piel y verter todo el contenido de la pipeta en un mismo punto.

# FICHA TÉCNICA

## DOSIS

1 pipeta de 0,50 ml para perros de 1 a 5 kg  
1 pipeta de 1.0 ml para perros de 5 a 10 kg  
1 pipeta de 2.5 ml para perros de 10 a 25 kg  
1 pipeta de 4.0 ml para perros de 25 a 40 kg

## MODO DE EMPLEO

Para el tratamiento de pulgas repetir la dosificación cada 40 días. Para el tratamiento de las garrapatas repetir la dosificación cada 30 días. Para el tratamiento de piojos, en caso necesario, repetir la dosificación a los 30 días. La duración del tratamiento dependerá del criterio del Médico Veterinario actuante; el intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas. El combate de los ectoparásitos deberá realizarse no solo en el animal sino también en el ambiente y de este combate dependerá en gran medida el éxito y duración del tratamiento.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica spot on.

## PRECAUCIONES:

Evitar todo contacto con la piel y ojos, es conveniente utilizar guantes y gafas para su aplicación. Lavarse bien con agua y jabón después de aplicar el producto.

## TOXICIDAD

En caso de ingestión accidental o intoxicación llamar inmediatamente al médico. El producto no tiene antídoto. En caso de intoxicación realizar tratamiento sintomático y de sostén.

En caso de inhalación remover la persona a un lugar con aire fresco y llamar al médico.

En caso de tener contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

Consultar al médico si la irritación persiste.

## CONTRAINDICACIONES:

No administrar a animales enfermos, debilitados y/o con deficiencias nutricionales severas. No administrar a cachorros con menos de 8 semanas de edad y/o con menos de 2 kg de peso. No utilizar en conejos ni en gatos.

## TIPO DE VENTA

Producto de venta libre.

## ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en su envase original herméticamente cerrado a una temperatura no mayor a 30°C, al abrigo de la luz y alejado de los alimentos.

## PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

24 meses.

## PRESENTACIÓN

Pipetas de 0.5 ml, 1.0 ml, 2.5 ml y 4.0 ml.

## REGISTRO

Ecuador: 3B3-14071- AGROCALIDAD

**ELABORADO POR LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY S.A., DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE QUITO - ECUADOR**