

## CEFAPET SUSPENSIÓN®



**Antibiótico oral de amplio espectro**



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

### COMPOSICIÓN

Cada 100 g de polvo para reconstituir contienen:

Cefalexina monohidrato (93,7%)	12,314 g
Equivalentes a Cefalexina base	11,538 g
Excipientes c.s.p.	100,000 g
Cada 5 ml de esta suspensión contiene 250 mg de cefalexina base.	

### FORMA FARMACÉUTICA

Polvo para reconstituir.

### ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Caninos y felinos.

### INDICACIONES

**cefapet suspensión** está indicado en el tratamiento de enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la cefalexina en perros y gatos. Se recomienda especialmente para el tratamiento de infecciones de piel, vías urinarias, vías respiratorias, tejido óseo y tejidos blandos causadas por los siguientes gérmenes: *Staphylococcus aureus* (incluso el productor de  $\beta$ -lactamasas), *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus epidermidis*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus spp*, *Pneumococcus spp*, *Clostridium spp*, *Corynebacterium spp*, *Neisseria spp*,

*Escherichia coli*, *Salmonella spp*, *Shigella spp*, *Klebsiella spp*, *Haemophilus spp* y *Proteus mirabilis*.

### MODO DE EMPLEO

Agite y añada progresivamente agua potable o previamente hervida y enfriada (42 ml) hasta el nivel que señala la flecha de la etiqueta. Siguiendo estas instrucciones se obtiene 60 ml. Una vez preparada la suspensión no debe conservársela más de 8 días. Incluye jeringa dosificadora. Se recomienda lavarla cada vez que sea utilizada. Agite la suspensión antes de cada administración.

### DOSIS

**cefapet suspensión** se administra por vía oral en dosis de 11 a 33 mg de cefalexina por cada kg de peso, equivalentes a 1 a 3 ml/5 kg de peso, cada 6,8 o 12 horas según el criterio del Médico Veterinario.

**DURACION DEL TRATAMIENTO:** De manera general el tratamiento debe mantenerse durante 5-7 días después de la resolución clínica de la infección. En casos de piodermas recurrentes, el tratamiento debe mantenerse durante 3 meses y si son profundos hasta 6 meses.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

### PRECAUCIONES:

Uso Veterinario  
Mantener fuera del alcance de los niños.

### CONTRAINDICACIONES:

No debe administrarse en caso de hipersensibilidad a las penicilinas y/o cefalosporinas. No administrar en pacientes con disfunción renal.

### TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

### ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz. Una vez preparada la suspensión, el producto es estable hasta por 7 días, conservándose en refrigeración preferiblemente.

### PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

36 meses.

### PRESENTACIÓN

Frasco x 100 ml.

### REGISTROS:

Ecuador 2C1-14303-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR**