

LEVALIF 15%®

FICHA TÉCNICA



Antiparasitario interno inyectable



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN

Cada ml contiene:
Levamisol clorhidrato 150 mg
Vehículo acuoso c.s.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y
aves.

INDICACIONES

Control de formas maduras e inmaduras
de parásitos gastrointestinales y
pulmonares como *Bunostomum*,
Chabertia, *Cooperia*, *Haemonchus*,
Nematodirus, *Dictyocaulus* *Ostertagia*,
Oesophagostomum y *Trichostrongylus*.
En porcinos es efectivo contra Ascáridos,
Hyostrongylus, *Metastrongylus* y
Oesophagostomum.

En aves es efectivo contra *Askaridia*,
Heterakis y *Capillaria*.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La dosis general es de 5 mg por kilo de
peso, equivalente a 1 ml por cada 30
kilos de peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular profunda.

En aves administrar por vía oral, disuelto
en el agua de bebida. Para control de
Askaridia, *Heterakis* y *Capillaria*,
administrar 23 - 30 mg/kilo (0,14 - 0,25
ml/kilo). En *Capillaria* usar la dosis
mayor.

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.
Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de reacción anafiláctica
administrar adrenalina.

TIEMPO DE RETIRO

Leche: 24 horas.
Carne: 3 días.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en equinos.
No inyectar más de 10 ml en un sólo sitio
de aplicación.

ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a
30°C y proteger de la luz.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

36 meses.

PRESENTACIÓN

Frascos x 20 ml, 100 ml y 500 ml.

REGISTROS:

Ecuador 3A2-2934-AGROCALIDAD
Colombia ICA No. 2644-DB

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR