

PROLIF L-8®



Bacterina contra la leptospirosis



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN

Cada dosis bovina (3 ml) contiene una cantidad $>$ a 10^7 bacterias de los siguientes serovares de *Leptospira*: *canicola*, *grippotyphosa*, *hardjo cepas*: *Hardjoprajitno* y *Hardjobovis*, *pomona*, *tarassovi*, *icterohaemorrhagiae* y *wolffi*. Hidróxido de aluminio y excipientes, c.s.

FORMA FARMACÉUTICA

Bacterina en suspensión.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, ovinos y porcinos.

INDICACIONES

Prolif- L8 es una bacterina indicada para la prevención de la leptospirosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Bovinos: Aplicar 3 ml a partir de los 3 o 4 meses de edad. Cuando se administra por primera vez, se debe aplicar una segunda dosis a los 21 a 30 días.

Es aconsejable vacunar a las vacas y vaconas entre los 3 y los 6 meses de preñez.

Ovinos y Porcinos: Aplicar una dosis de 2 ml.

Revacunación anual.

VIA DE ADMINISTRACION

Intramuscular o subcutánea.

PRECAUCIONES:

Uso veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Agitar suavemente el frasco antes de usar.

En caso de reacción anafiláctica, administrar adrenalina (epinefrina) y un corticoide tipo dexametasona (en hembras preñadas no administrar corticoides sino flunixin meglumina) y consultar al Médico Veterinario. En caso de animales con antecedentes de reacción anafiláctica, esta puede evitarse o disminuir su intensidad, mediante la aplicación de un antihistamínico 30 a 45 minutos antes de la vacunación.

TIEMPO DE RETIRO:

No tiene.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados.

ALMACENAMIENTO

Conservar en refrigeración entre 2° C y 8° C. No congelar.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

18 meses.

PRESENTACIÓN

Frasco x 15 dosis bovinas (45 ml).

REGISTRO:

Ecuador 4A-10220-AGROCALIDAD

ELABORADO POR VIRBAC URUGUAY S.A. – MONTEVIDEO, URUGUAY. DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR