

RADEK GRANULADO®



Antiparasitario interno oral



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN:

Fenbendazol	2,2 g
Excipientes c.s.p.	10 g

FORMA FARMACÉUTICA

Granulado.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos.

INDICACIONES

Control de parásitos de bovinos, ovinos y caprinos: *Ostertagia ostertagi.*, (L3 y L4 incluyendo inhibidas), *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Nematodirus*, *Strongyloides*, *Capillaria*, *Bunostomum*, *Dictyocaulus*, *Oesophagostomum*, *Chavertia*, *Moniezia*.

Parásitos de porcinos: *Hyostrongylus*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Ascaris*, *Trichuris*, *Metastrongylus*, *Stephanurus*.

Parásitos de equinos: Grandes estróngilos (*Strongylus*), Pequeños estróngilos (*Oxyuris*), *Parascaris*.

Parásitos de caninos: *Ancylostoma*, *Uncinaria*, *Trichuris*, *Toxocara*, *Toxascaris* y *Taenia pisciformis*.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

En bovinos, ovinos, caprinos y porcinos,

FICHA TÉCNICA

administrar 5 mg por kg de peso equivalentes a 1/2 sobre de **radek granulado** por cada 200 kilos de peso en una sola dosis. En equinos administrar 7.5 mg de fenbendazol por kg de peso, equivalentes a 1/2 sobre de **radek granulado**, por cada 150 kg de peso en una sola dosis. En caninos administrar 50 mg/ de fenbendazol por kg de peso equivalentes a 1/4 de sobre de **radek granulado** por cada 10 kg de peso, una vez al día, durante 3 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

TIEMPO DE RETIRO

No tiene tiempo de retiro en leche para bovinos.

Los animales destinados para consumo humano, no deben sacrificarse antes de los siguientes períodos de tiempo después de finalizado el tratamiento:

Bovinos 8 días,

Porcinos 3 días,

Ovinos 8 días,

Caprinos 14 días.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en caprinos cuando la

leche se destine al consumo humano. No administrar en equinos cuando sean para consumo humano.

ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C y proteger de la luz.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

24 meses.

PRESENTACIÓN

Caja dispensadora de 50 sobres por 10 gramos.

REGISTROS:

Ecuador 3A1-6290-AGROCALIDAD
Colombia ICA No. 6419-MV

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR