



Antibacteriano inyectable de amplio espectro



NUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN

Cada ml contiene:

Sulfadoxina 200 mg

Trimetoprim 40 mg

Vehículo acuoso c.s.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.

INDICACIONES

Bactericida indicado en el tratamiento de infecciones producidas por gérmenes grampositivos y gramnegativos, en especial en infecciones urinarias, respiratorias, gastrointestinales y de órganos genitales. Se recomienda especialmente en neumonía, septicemia, rinitis, bronconeumonía, pleuroneumonía, enteritis, infecciones del ombligo, colibacilosis, difteria, artritis, meningitis, panadizo, abscesos, heridas infectadas, bordetelosis, metritis, infecciones vaginales, pielonefritis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La dosis general es de 3-4 ml/50 kilos de peso. Aunque aparentemente, pueden obtenerse resultados satisfactorios luego de una sola dosis, es conveniente repetir la administración luego de 24 - 48 horas

a fin de garantizar la supresión completa del agente infectante.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular preferentemente. Se puede utilizar la vía intravenosa bajo vigilancia profesional pero con las siguientes precauciones:

Administrar la totalidad de la dosis del producto en forma lenta (en no menos de un minuto).

No administrar en animales estresados, cansados o nerviosos.

Existen reportes de reacciones fatales en equinos, ocurridas después de la administración de productos a base de sulfa-trimetoprim por vía intravenosa. Estas reacciones se atribuyen a: 1) sobredosis del producto, 2) inyección rápida y, 3) Hipersensibilidad al producto.

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Es conveniente proveer al animal de abundante agua.

En caso de reacción anafiláctica administrar adrenalina.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de

finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales con historia de sensibilidad a las sulfonamidas.

No administrar en animales con lesiones del parénquima hepático, discrasias sanguíneas, enfermedades renales o urolitiasis.

No administrar en combinación con el sedante detomidina.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

36 meses.

PRESENTACIÓN

Frascos x 20 ml y 100 ml.

REGISTROS:

Ecuador 2B1-1896-AGROCALIDAD
Colombia ICA No. 1.857-DB

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR