

## TRAMICIN SOLUBLE®



Antibiótico oral de amplio espectro



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

### COMPOSICIÓN

Oximetetraciclina Clorhidrato	12,5	g
Lactosa monohidrato (vehículo)	c.s.p.	100,0 g

### FORMA FARMACÉUTICA

Granulado

### ESPECIES EN LAS CUALES ESTÁ INDICADO SU USO

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.

### INDICACIONES

Tratamiento de enfermedades producidas por microorganismos sensibles a la acción de la oximetetraciclina. Se recomienda especialmente en: difteria, neumoenteritis, colibacilosis, pasteurellosis, infecciones respiratorias, y cólera aviar.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

**Tramicín soluble** se administra en dosis de 4 a 8 gramos por cada 50 kg de peso en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.

#### Dosis Tramicín soluble aves

Mezclar en el agua de bebida 100 gramos por cada 200 litros de agua como tratamiento curativo y 50 gramos por 200 litros de agua como tratamiento preventivo.

Estas dosis deben administrarse cada 24

horas por 3 a 5 días y pueden modificarse, de acuerdo con el criterio del médico veterinario.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

### PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

### TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

### ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz.

### PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

24 meses.

### PRESENTACIÓN

Sobres x 20 gramos

### REGISTROS:

Ecuador 2C1-2846-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR  
LABORATORIOS LIFE-ECUADOR