

VETERCILIN D®



**Combinación antibiótica –
antiinflamatoria inyectable de
amplio espectro**



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN

Cada frasco con polvo contiene:

Estreptomina Sulfato
equivalente en base 5 g
Penicilina G Procaínica 3'000.000 UI
Penicilina G Sódica 2'000.000 UI

Diluyente:

Diclofenaco Sódico (15 mg/ml) 20 ml

Después de reconstituido, cada frasco de **vetercilin D** contiene 28 ml de suspensión antibiótica. Cada ml de esta suspensión contiene 178.571 U.I. de penicilinas, 178.571 mg de estreptomina y 0,5 gramos de diclofenaco.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo para reconstituir suspensión inyectable.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.

INDICACIONES

Para el tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes sensibles a la penicilina y la estreptomina. Se recomienda especialmente en: carbón bacteriano, carbón sintomático, erisipela, tétanos, pododermatitis (panadizo), disentería vibriónica,

FICHA TÉCNICA

poliartritis infecciosa, neumonía, pielonefritis, hepatitis necrótica infecciosa, difteria, conjuntivitis, peritonitis, otitis externa, adenitis equina, complicaciones de fiebre aftosa, muermo y tuberculosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Agregue la totalidad del diluyente (20 ml) al frasco con el antibiótico en polvo y administre 3 ml por cada 50 kilos de peso vivo del animal diariamente por 3 a 5 días, de acuerdo con el criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de reacción anafiláctica administrar adrenalina.

TIEMPO DE RETIRO

No administrar en animales destinados al consumo humano 30 días antes del sacrificio. La leche de hembras tratadas sirve para consumo humano luego de 72 horas de suspendido el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar por vía intravenosa, subcutánea u oral.

No administrar a animales con deficiencias renales.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO:

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz. Una vez realizada la dilución, usar lo más pronto posible: se mantiene estable durante 24 horas a temperatura ambiente y en refrigeración, 3 - 7° C. durante 5 – 7 días.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

24 meses.

PRESENTACIÓN

Frascos x 5 millones de UI de penicilinas y 5 g de estreptomina.

REGISTROS:

Colombia ICA No. 8712-MV

Ecuador 2C4-8403-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE-ECUADOR