VIRKOS ULTRAFORTE®

FICHA TÉCNICA



Garrapaticida - mosquicida



COMPOSICIÓN

Cipermetrina 10 g Ethion 40 g Excipientes c.s.p. 100 ml

FORMA FARMACÉUTICA Solución.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO Bovinos.

INDICACIONES

Ectoparasiticida bovinos. para sarnífugo y Garrapaticida, piojicida, mosquicida. Garrapaticida e insecticida de acción prolongada. Controla la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus con un poder residual de 21 días. Piojicida (controla piojos chupadores masticadores), sarnífugo y mosquicida los cuernos) (mosca de de acción repelente por un período de 3 a 4 semanas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Baño de aspersión: usando bombas de fumigar u otro equipo de aspersión, rociar al ganado con una mezcla de 1 ml de virkos ultra forte por litro de agua (1 ml/ 1.000 ml). Para una bomba de 20 litros utilizar 20 ml de virkos ultra forte. En este caso, utilizar aproximadamente 3 a 4 litros de solución por animal.

Baño de inmersión: aplicar 1 litro del

producto por cada 1.000 litros de agua (1:1.000). Para recargar el baño adicionar 1,5 litros de virkos ultra forte por cada 1.000 litros de agua que se vaya a reponer.

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Uso externo.

PRECAUCIONES:

Uso veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar la contaminación de cualquier fuente de agua con el producto o envases vacíos. Tóxico para la vida acuática.

VIRKOS ULTRA FORTE es un producto clasificado dentro de la categoría toxicológica II, LIGERAMENTE TÓXICO. Manipular el producto con precaución. Utilizar vestimenta de protección adecuada. Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar y luego de manipular el producto.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto del producto con piel y mucosas, lavar rápidamente con abundante agua y jabón durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental realizar lavado gástrico, no provocar el vómito.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 15 días Leche: 2 días

CONTRAINDICACIONES:

No administrar simultáneamente con otros insecticidas. No bañar animales estresados. cansados. sedientos. enfermos, ni con severas lesiones de piel. No se recomienda realizar el baño en de excesivo calor ni con horas inclemencias climáticas.

No se recomienda bañar terneros menores a 3 meses de edad. No reutilizar los envases vacíos.

TIPO DE VENTA

Producto de venta libre.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original herméticamente cerrado, a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz y en un área bien ventilada.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO 24 meses.

PRESENTACIÓN

Envases por 20 ml, 100 ml y 1 litro.

REGISTRO:

Ecuador 3B-12919-AGROCALIDAD

ELABORADO POR LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY S.A., DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS LIFE - ECUADOR.